

Bestimmung der Orte gewisser Elemente,
welche drei collinearen Räumen gegenüber eine
ausgezeichnete Stellung einnehmen.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
bei der
hohen philosophischen Facultät
der
kgl. Ludwig-Maximilians-Universität München
eingereicht
von
Otto Dotterweich
aus Bamberg.

München' 1885.

Kgl. Hof- & Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Bestimmung der Orte gewisser Elemente,
welche drei collinearen Räumen gegenüber eine
ausgezeichnete Stellung einnehmen.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
bei der
hohen philosophischen Facultät

der
kgl. Ludwig-Maximilians-Universität München

eingereicht
von
Otto Dotterweich

aus Bamberg.

München 1885.

Kgl. Hof- & Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die zu drei collinearen Räumen gehörigen Strahlenkomplexe.

Von zwei collinearen Räumen wird ein tetraedraler Strahlencomplex zweiter Ordnung, zweiter Klasse sowohl durch die Verbindungslinien homologer Punkte als auch durch die Schnittlinien homologer Ebenen erzeugt und gehören ihm desshalb von jedem Raume alle Geraden an, welche von den homologen des anderen geschnitten werden. Durch jeden Punkt geht im Allgemeinen ein Kegel zweiter Ordnung von Complexstrahlen und in jeder Ebene liegt ein Büschel zweiter Ordnung solcher Strahlen. Es gibt jedoch vier Punkte und vier Ebenen, deren sämtliche Gerade dem Complexe angehören, nämlich jene Punkte und Ebenen, welche die Räume entsprechend gemein haben. Sie bilden das Fundamentaltetraeder des Complexes und sind entweder reell oder paarweise imaginär*)

Sind Σ_i und Σ_k die erzeugenden Räume, so möge der Complex mit Γ_{ik} bezeichnet werden; die Ecken des Fundamentaltetraeders sollen A_{ik}^x heissen, wo unter x eine bestimmte

*) Reye, Geometrie der Lage. II. Aufl. II. Theil XVIII. Vortrag.

der Zahlen 1, 2, 3, 4 zu verstehen ist; die dem Punkte A_{ik}^x gegenüberliegende Tetraederebene werde α_{ik}^x genannt.

Drei collineare Räume $\Sigma_i \Sigma_k \Sigma_l$ geben zu drei Strahlencomplexen Anlass; denn weil Γ_{ik} und Γ_{ki} denselben Complex bezeichnen, so liefert jede Combination der Räume zu zweien einen Complex.

Die den Elementen A_{ik}^x und α_{ik}^x in Σ_i entsprechenden Elemente sollen durch $A_{ik}^{x'}$ resp. $\alpha_{ik}^{x'}$ bezeichnet werden und das von ihnen gebildete Tetraeder heisse das »Nebentetraeder« des Complexes Γ_{ik} .

Durch jeden Punkt geht ein Kegel zweiter Ordnung des Complexes Γ_{ik} und ein ebensolcher Kegel des Complexes Γ_{il} ; da diese beiden Kegel vier Strahlen, die entweder alle reell oder paarweise imaginär sind, gemein haben, so gehen durch jeden Punkt vier Strahlen, welche beiden Complexen gleichzeitig angehören; ebenso zeigt man, dass in jeder Ebene vier zu beiden Complexen gehörige Gerade liegen; also:

Die Strahlencomplexes Γ_{ik} und Γ_{il} haben ein Strahlensystem vierter Ordnung, vierter Klasse gemein.

Jeder Strahl p_i dieses Systems, als Strahl des Raumes Σ_i aufgefasst, wird von den ihm in Σ_k und Σ_l correspondirenden Geraden geschnitten, weil er zum Complexen Γ_{ik} und Γ_{il} gehört, also:

Die Strahlen p_i des Raumes Σ_i , welche von den in Σ_k und Σ_l correspondirenden Geradengeschnitten werden, bilden ein Strahlensystem vierter Ordnung, vierter Klasse.

Weil dieses System aus Strahlen des Raumes Σ_i besteht,

so werde es mit X_i bezeichnet. Zu jedem der drei Räume gehört ein solches System.

Flächen vierter Ordnung.

Unter allen Strahlen des Complexes Γ_{ik} , welche durch einen Punkt P_i gehen, ist derjenige ausgezeichnet, welcher von dem ihm in Σ_k entsprechenden Strahle im Punkte P_i geschnitten wird. Rechnet man den Punkt P_i zu Σ_k und bezeichnet ihn mit Q_k , so ist $P_i Q_i$ dieser ausgezeichnete Strahl, wenn Q_i und Q_k homologe Elemente sind.

Nun möge sich $P_i [Q_k]$ auf einer beliebigen Geraden bewegen. Rechnet man dieselbe zum Raume Σ_k und bezeichnet sie mit m_k , so entspricht ihr in Σ_i eine Gerade m_i , der Punktreihe Q_k auf m_k entspricht eine zu ihr projectivische Punktreihe Q_i auf m_i . Die Verbindungslinien entsprechender Punkte dieser projectivischen Reihen sind, weil Q_k mit P_i identisch, diejenigen Geraden s_i des Raumes Σ_i , welche von den in Σ_k entsprechenden Strahlen s_k in den Punkten der Geraden m_k geschnitten werden. Diese Geraden bilden im Allgemeinen eine Regelschaar R_i^2 zweiter Ordnung. Dieselbe geht in ein Strahlenbüschel zweiter Ordnung über, wenn m_k und m_i in einer Ebene liegen, also m_k Complexstrahl von Γ_{ik} ist. Dieses Strahlenbüschel wiederum degenerirt in zwei Strahlbüschel erster Ordnung, wenn die Punktfolgen auf m_i und m_k perspectivisch liegen; in diesem Falle ist der Schnittpunkt beider Geraden entsprechender Punkt der projectivischen Reihen, also homologer Punkt Σ_i und Σ_k d. h. ein Punkt A_{ik}^x . Er ist das Centrum des einen Strahl-

büschels; das des anderen liegt auf der Schnittgeraden der Ebenen $[m_i m_k]$ und α_{ik}^x , weil die Punkte $(\alpha_{ik}^x m_i)$ und $(\alpha_{ik}^x m_k)$ homologe Punkte der Reihen auf m_i und m_k sind. Ist endlich m_k Kante des Fundamentaltetraeders des Complexes Γ_{ik} , so fällt m_i auf m_k . Man hat demnach:

Die Strahlen des Raumes Σ_i , welche von den entsprechenden Geraden des Raumes Σ_k in den Punkten einer beliebigen Geraden m_k getroffen werden, bilden eine Regelschaar R_i zweiter Ordnung, welche bei speziellen Lagen der Geraden entartet.

Rechnet man m_k zu Σ_i und bezeichnet es mit n_i , so entsprechen den Geraden m_i und n_i in Σ_i die Geraden m_i und n_i , den Punktreihen P_i und Q_i auf n_i resp. m_i die zu ihnen projectivischen Reihen P_i und Q_i auf n_i resp. m_i und somit den Geraden $P_i Q_i = s_i$ die Geraden $P_i Q_i = s_i$. Die s_i bilden eine Regelschaar R_i^2 zweiter Ordnung, welche gleichzeitig mit R_i^2 degenerirt, weil sich mit m_i und n_i die Geraden m_i und n_i gleichzeitig schneiden und decken und die Punktreihen P_i und Q_i gleichzeitig mit P_i und Q_i perspectivisch liegen. Auch ist die Regelschaar R_i^2 projectivisch auf R_i^2 bezogen, wenn jedem Strahle s_i der homologe s_i zugewiesen wird.

Die beiden Hyperboloide, auf welchen die Regelschaaren R_i^2 und R_i^2 liegen, schneiden sich in einer Raumcurve C^4 vierter Ordnung. Nun sei r_i ein beliebiger Leitstrahl der Schaar R_i , r_i ein solcher der Schaar R_i^2 . Auf jedem dieser Strahlen liegen zwei Punkte von C^4 und aus jedem wird die zugehörige Schaar durch einen zu ihr projectivischen Ebenenbüschel erster Ordnung projecirt. Diese beiden Büschel sind

projectivisch aufeinander bezogen, wenn jeder Ebene des ersten, welche einen Strahl s_i projecirt, die Ebene des zweiten zugewiesen wird, welche den homologen Strahl s_i projecirt; sie erzeugen dann ein Hyperboloid R^2 . Wenn nicht die Schnittcurve C^4 in eine Gerade und eine Raumcurve dritter Ordnung degenerirt und nicht alle homologen Strahlen der Schaaren R_1^2 und R_2^2 sich schneiden, so haben die drei Hyperboloide höchstens acht Punkte gemein: vier von diesen sind die Schnittpunkte der Geraden r_1 und r_2 mit C^4 , die übrigen vier sind jene Punkte, in welchen sich homologe Strahlen der projectivischen Regelschaaren R_1^2 und R_2^2 schneiden; daraus folgt der Satz:

Sind zwei Regelschaaren R_1^2 und R_2^2 projectivisch aufeinander bezogen, so schneiden sich im Allgemeinen vier Paare homologer Strahlen.

Gehen die Regelschaaren in zwei Strahlenbüschel zweiter Ordnung über, so schneiden sich auf der Schnittlinie der tragenden Ebenen gleichfalls vier homologe Strahlen s_i und s_i . Dreht man nämlich die Ebene des einen Büschels um diese Schnittlinie, bis sie mit der Ebene des anderen Büschels zusammenfällt, so erzeugen die projectivischen Strahlbüschel eine ebene Curve vierter Ordnung, die von jeder Geraden in vier Punkten getroffen wird.

Degeneriren endlich diese Büschel in je zwei Strahlenbüschel erster Ordnung, so schneiden sich von je zwei homologen Büscheln je zwei homologe Strahlen; es gibt auch in diesem Falle vier Strahlen s_i welche von den homologen s_i geschnitten werden.

Die Strahlen s_i welche von den entsprechenden s_i ge-

schnitten werden, sind aber Strahlen p_i des Systemes X_i . Abgesehen von dem Falle, dass m_i und m_k ineinanderliegen, welcher Fall nachträglich besprochen werden soll, ist also für eine beliebige Gerade m_k nachgewiesen, dass es auf ihr vier Punkte gibt, in welchen ein Strahl p_i des Systems X_i von dem in Σ_k entsprechenden Strahle p_k geschnitten wird. Da ferner die Punkte $(p_i p_k)$ und $(p_i p_l)$ dem Systeme X_i ganz gleich gegenüberstehen, so gilt der Satz:

Versteht man unter p_i die Strahlen, welche von den homologen Strahlen p_k und p_l geschnitten werden, so bilden sowohl die Punkte $(p_i p_k)$ als auch die Punkte $(p_i p_l)$ eine Fläche vierter Ordnung.

Die von den Punkten $(p_i p_k)$ gebildete Fläche soll fernerhin mit F_{ik}^4 bezeichnet werden, wobei zu bemerken ist, dass die Indices ik in ihrer Stellung nicht vertauscht werden können; denn während auf F_{ik}^4 diejenigen Punkte liegen, in welchen die Strahlen des Systemes X_i von den in Σ_k correspondirenden Geraden getroffen werden, ist F_{ki}^4 der Ort der Punkte, durch welche ein Systemstrahl von X_k und die ihm in Σ_i correspondirende Gerade geht. Aus dieser Bezeichnungsweise folgt unmittelbar, dass die drei Räume zu so viel Flächen F^4 Anlass geben, als es Variationen dreier Elemente zu zweien gibt, also zu sechs Flächen.

Doppelpunkte auf F_{ik}^4 .

Zu den Doppelpunkten auf F_{ik}^4 führt die Annahme, dass die Gerade m_k Tetraederkante des Complexes Γ_{ik} ist. Die projectivischen Punktreihen Q_i und Q_k liegen aufeinander, so

dass der Strahl s_i , welcher in Q_k von dem entsprechenden s_k geschnitten wird, die Gerade m_k selbst ist. Da diesem Strahle in Σ_i eine Kante des Nebentetraeders des Complexes Γ_{ik} entspricht, welche bei allgemeiner Annahme der drei Räume m_k nicht schneidet, so liegt kein Punkt von m_k auf F_{ik}^4 , wenn es nicht auf m_k Punkte gibt, durch welche von m_k verschiedene Strahlen s_i gehen. In der That gibt es zwei solche Punkte, nämlich die zwei auf m_k liegenden Punkte A_{ik}^x . Da diese Punkte die Doppelpunkte der Reihen Q_i und Q_k sind, so ist jeder Strahl durch A_{ik}^x ein Strahl s_i , welcher vom homologen s_k in A_{ik}^x geschnitten wird.

Jedem dieser Strahlen s_i entspricht in Σ_i ein Strahl s_i durch A_{ik}^x und die Bündel A_{ik}^x und A_{ik}^x sind collinear aufeinander bezogen. So oft zwei entsprechende Strahlen der Bündel sich schneiden, ebenso oft wird der Punkt A_{ik}^x als Punkt der Fläche F_{ik}^4 erhalten.

Nun erzeugen die collinearen Bündel durch die Schnittpunkte homologer Strahlen eine Raumcurve dritter Ordnung und in jeder Ebene durch A_{ik}^x liegen zwei durch A_{ik}^x gehende Sehnen derselben. Jede solche Ebene schneidet demnach F_{ik}^4 in einer ebenen Curve vierter Ordnung, für welche A_{ik}^x Doppelpunkt ist; folglich ist A_{ik}^x Doppelpunkt der Fläche F_{ik}^4 . Weil A_{ik}^x identisch mit A_{ki}^x , so sind eben diese Punkte auch Doppelpunkte von F_{ki}^4 und es gilt:

Die Eckpunkte des Fundamentaltetraeders eines Complexes sind Doppelpunkte der beiden Flächen vierter Ordnung, welche dieselben Indices besitzen wie der Complex.

Da die Geraden, welche die Raumcurve aus A_{ik}^x projeciren, einen Kegel zweiter Ordnung bilden, diese Geraden p_i Strahlen des Systems X_i sind, und weil endlich die Complexe Γ_{ik} und Γ_{il} dem Systeme X_i gegenüber dieselbe Rolle spielen, lässt sich folgern:

Das Strahlensystem X_i enthält acht Kegel zweiter Ordnung; es sind die zu den Complexen Γ_{il} und Γ_{ik} gehörigen Kegel, deren Mittelpunkte die A_{ik}^x resp. die A_{il}^x sind.

Raumcurven dritter Ordnung auf F_{il}^4 .

Sind p_i und p_l homologe, sich schneidende Strahlen der Bündel A_{ik}^x und $A_{ik}'^x$, so ist der Punkt $(p_i p_l)$ ein Punkt der Fläche F_{il}^4 , weil jeder Strahl p_i , der durch A_{ik}^x von dem in Σ_k correspondirenden Strahl p_k [in A_{ik}^x] geschnitten wird. Die Raumcurve dritter Ordnung, welche durch die Schnittpunkte homologer Strahlen der Bündel A_{ik}^x und $A_{ik}'^x$ gebildet wird, wenn A_{ik}^x als Bündel des Raumes Σ_i betrachtet wird, liegt ganz auf F_{il}^4 .

Diese Curve ist durch sechs ihrer Punkte bestimmt; denn auf ihr liegen: 1. der Eckpunkt A_{ik}^x des Fundamentaltetraeders des Complexes Γ_{ik} ; 2. der homologe Eckpunkt des Nebentetraeders dieses Complexes und 3. die vier Eckpunkte des Fundamentaltetraeders des Complexes Γ_{il} , eine solche Ecke A_{il}^x gehört der Curve an, weil die Geraden $[A_{ik}^x A_{il}^x]$ und $[A_{ik}'^x A_{il}^x]$ als Verbindungslinie homologer Punktpaare der Räume Σ_i und Σ_l homologe Strahlen der Bündel A_{ik}^x und $A_{ik}'^x$ sind.

Die Schnittcurven der Flächen vierter Ordnung.

Die Schnittcurve zweier der sechs Flächen vierter Ordnung ist eine Raumcurve sechzehnter Ordnung. Die Punkte derselben haben den drei Räumen gegenüber je nach Art der Zusammenstellung der Flächen eine verschiedene Eigenschaft.

Bei der Untersuchung müssen vier Fälle unterschieden werden; es schneiden sich:

I. Zwei Flächen mit gleichem Index an erster Stelle wie F_{ik}^4 und F_{il}^4 . Durch jeden Punkt P der Schnittlinie gehen dann zwei Strahlen des Systemes X_i , von denen der eine p_i von dem in Σ_k entsprechenden Strahle p_k , der andere p_i von dem in Σ_l entsprechenden Strahle p'_l in P getroffen wird;

II. zwei Flächen mit gleichem Index an zweiter Stelle wie F_{ki}^4 und F_{li}^4 ; dann geht durch P ein Strahl p_k des Systemes X_k und der entsprechende p_i von Σ_l , sowie ein Strahl p'_i des Systemes X_l und der entsprechende Strahl p'_i von Σ_i ;

III. zwei Flächen, welche dieselben Indices, aber an verschiedenen Stellen besitzen wie F_{ik}^4 und F_{ki}^4 ; durch jeden Punkt P geht ein Strahl p_i des Systems X_i und der entsprechende p_k des Raumes Σ_k , sowie ein Strahl p'_k des Systemes Σ_k und der entsprechende p'_i des Raumes Σ_i .

IV. zwei Flächen, welche die drei Indices besitzen, aber an keiner Stelle den gleichen, wie F_{ik}^4 und F_{ki}^4 ; durch jeden Punkt P der Curve geht ein Strahl p_i des Systemes X_i welcher von dem in Σ_k correspondirenden und ein Strahl p'_k des Systemes X_k , der von dem in Σ_i correspondirenden Strahle p_i im Punkte P getroffen wird.

Aus den angegebenen Eigenschaften der Punkte der verschiedenen Schnittcurven erkennt man für jeden einzelnen Fall, dass auf der Curve alle die Punkte liegen, in welchen sich drei homologe Strahlen der collinearen Räume schneiden.

Solche Punkte — die «Hauptpunkte der collinearen Räume» — bilden bekanntlich eine Raumcurve sechster Ordnung, was sich auf folgende Weise zeigen lässt.

Die Hauptpunkte besitzen die Eigenschaft, dass sie auf jeder Fläche dritter Ordnung liegen, welche durch homologe Bündel der collinearen Räume erzeugt wird. Sind nämlich $P_i P_k P_l$ drei homologe Bündel, $h_i h_k h_l$ die homologen Strahlen, welche sich in einem Hauptpunkte H schneiden, so sind $(P_i h_i)$ $(P_k h_k)$ $(P_l h_l)$ homologe Ebenen der drei Bündel, folglich liegt H auf der von den Bündel $P_i P_k P_l$ durch Schnittpunkte homologer Ebenen erzeugten Fläche. Eine zweite durch die homologen Bündel $P'_i P'_k P'_l$ erzeugte Fläche hat mit der ersten eine Raumcurve neunter Ordnung gemein. Diese degenerirt in die Raumcurve dritter Ordnung, welche von den projektivischen Ebenenbüscheln $P_i P'_i P_k P'_k P_l P'_l$ erzeugt wird und in eine Raumcurve sechster Ordnung. Die Raumcurve dritter Ordnung gehört nur jenem Büschel von Flächen dritter Ordnung zu, dessen Flächen durch Bündel erzeugt werden, deren Mittelpunkte resp. auf den Geraden $P_i P'_i P_k P'_k P_l P'_l$ liegen. Weil die Hauptpunkte H Punkte jeder Fläche dritter Ordnung sind, die durch drei homologe Bündel der collinearen Räume erzeugt wird, so kann die Raumcurve dritter Ordnung nicht der Ort für die Punkte H sein, diese müssen vielmehr auf dem anderen Theile der Schnittcurve d. h. auf der Raum-

curve sechster Ordnung enthalten sein. Auch zeigt sich, dass diese Curve aus den Hauptpunkten besteht; denn ist K ein Punkt, der auf beiden Flächen dritter Ordnung, aber nicht auf der Raumcurve dritter Ordnung liegt, so gehen durch ihn drei homologe Ebenen $\pi_i \pi_k \pi_l$, welche resp. zu den Bündeln $P_i P_k P_l$ und drei andere homologe Ebenen, $\pi'_i \pi'_k \pi'_l$, welche resp. zu den Bündeln $P'_i P'_k P'_l$ gehören. Die Geraden $\pi_i \pi'_i \pi_k \pi'_k \pi_l \pi'_l$ sind homologe Gerade der drei Räume und weil sie sich in K schneiden, ist K ein Hauptpunkt H . Darum gilt der Satz:

Die Schnittcurve irgend zweier der sechs Flächen vierter Ordnung degenerirt in eine Raumcurve zehnter Ordnung und in die von den Hauptpunkten gebildete Raumcurve sechster Ordnung.

Die unter II aufgeführte Schnittlinie sechzehnter Ordnung lässt sich vollkommen bestimmen; es können zwei Fälle eintreten: p_i und p'_i sind verschieden, p_i und p'_i sind identisch. Der zweite Fall liefert die Hauptpunkte; im ersten Falle geht durch den Punkt P der Strahl p_k des Systems X_k ; er wird von dem entsprechenden Strahle p_l geschnitten; ferner der Strahl p'_l des Systems X_l , er wird von dem entsprechenden Strahle p'_k geschnitten. Weil aber p_i und p'_i sich schneiden, so treffen sich auch p_k und p'_k , p_l und p'_l ; es liegen demnach die drei Strahlen p_k , p'_k und p_l und die Strahlen p'_k , p'_l , p_i in einer Ebene. Da jede dieser Ebenen die Strahlen p'_k , p_l enthält, so liegen die homologen Strahlenpaare p_k , p'_k und p_l , p'_l in einer Ebene; diese Ebene ist Tetraederebene des

Complexes Γ_{kl} . Die Geraden, in welchen die Ebene α_{kl}^x die homologen Ebenen α'_{kl}^x des Nebentetraeders schneiden, sind Theile der Raumcurve zehnter Ordnung und nur auf diesen Geraden können die Punkte P liegen, wenn p_i und p'_i verschieden sind. Der andere Theil der Raumcurve zehnter Ordnung muss also mit der Hauptpunktcurve zusammenfallen; diese ist also ein doppelt zu zählender Bestandtheil der Raumcurve sechzehnter Ordnung. Eine beliebige Ebene schneidet die Curve in sechzehn Punkten; vier von diesen sind die Schnittpunkte der Ebene mit den vier Geraden $[\alpha_{kl}^x, \alpha'_{kl}^x]$, die übrigen zwölf die doppelt zu zählenden Punkte der Hauptpunktcurve, welche in der Ebene liegen. In jedem derselben müssen zwei Punkte, die zu beiden Flächen gehören, zusammengefallen sein, oder: die zwei ebenen Curven vierter Ordnung, in welchen die Flächen F_{kl}^4 und F_{il}^4 von einer beliebigen Ebene geschnitten werden, gehen durch die sechs Hauptpunkte, welche in der Ebene liegen und haben in diesen Punkten gemeinsame Tangenten. Daraus folgt unmittelbar:

Zwei Flächen vierter Ordnung mit gleichem Index an zweiter Stelle haben in den Hauptpunkten dieselben Berührungsebenen.

Noch soll die Eigenschaft der unter III aufgeführten Schnittcurven präcisirt werden. Sind die p_i und p'_i verschieden, so gehen durch den Punkt P die homologen Strahlenpaare p_i, p'_i und p_k, p'_k ; P ist demnach Tetraedereckpunkt des Complexes Γ_{ik} . Um andere Punkte P zu erhalten, müssen p_i und p'_i zusammenfallen, dann sind die Strahlen p_i, p'_k der

Systeme X_i resp. X_k homologe Strahlen der Räume Σ_i und Σ_k . Durch die Punkte der Raumcurve sechzehnter Ordnung gehen also homologe Strahlen p_i und p_k der Räume Σ_i und Σ_k , welche beide von dem ihnen in Σ_i correspondirenden Strahle p_i getroffen werden. Dies kann auf zwei wesentlich verschiedene Arten geschehen: entweder geht p_i durch den Punkt P d. h. P ist Hauptpunkt und die Hauptpunktcurve bildet den einen Bestandtheil der Schnittcurve sechzehnter Ordnung oder p_i liegt in der Ebene $[p_i p_k]$; diese Punkte liegen auf einer Raumcurve zehnter Ordnung. Die homologen Strahlen bilden ein Dreieck und die Eckpunkte $(p_i p_k)$, $(p_k i)$, $(p_i p_i)$ liegen resp. auf den Flächen F_{ik}^4 und F_{ki}^4 , F_{ki}^4 und F_{ik}^4 , F_{ii}^4 und F_{ii}^4 . Daraus folgt der Satz:

Die Ecken der Dreiecke, welche von homologen Strahlen der collinearen Räume gebildet werden, liegen auf drei Raumcurven zehnter Ordnung.

Ebenenbündel vierter Ordnung.

Die folgenden Entwicklungen stehen den vorausgehenden dual gegenüber.

Die Ebenen, auf welchen ein Strahl p_i des Systemes X_i und der in Σ_k correspondirende Strahl p_k liegt, bilden einen Ebenenbündel vierter Ordnung Φ_{ik}^4 .

Ist nämlich m_k eine beliebige Gerade, so werden alle Geraden s_i des Raumes Σ_i , welche Strahlen des Complexes Γ_{ik} sind und in der Ebene $m_k s_k$ liegen gefunden, indem man die correspondirenden Ebenen der homologen Büschel m_i und

m_k der Räume Σ_i resp. Σ_k zum Durchschnitt bringt. Diese Geraden s_i bilden eine Regelschaar R_i , welcher im Raume Σ_i eine von den Geraden s_i gebildete, zu ihr projectivische Regelschaar R_i entspricht. Da sich, wie früher gezeigt wurde, von zwei projectivisch auf einander bezogenen Regelschaaren im Allgemeinen vier homologe Strahlen schneiden und die Geraden s_i , welche von den homologen s_i getroffen werden, Strahlen des Systemes X_i sind, so gehen durch die beliebige Gerade m_k vier Ebenen, welche einen Systemstrahl p_i und den in Σ_k entsprechenden p_k enthalten.

Wenn m_k Strahl des Complexes Γ_{ik} ist, so gehen die Regelschaaren R_i und R_i in Kegelflächen zweiter Ordnung über. Dass sich von zwei projectivisch aufeinander bezogenen Kegelflächen im Allgemeinen vier homologe Strahlen schneiden, erhärtet der für zwei projectivische Regelschaaren gegebene Beweis, wenn als Gerade r_i und r_i Strahlen der betreffenden Kegelflächen gewählt werden.

Haben die Büschel m_k und m_i eine Ebene entsprechend gemein [eine Ebene α_{ik}^x], so erzeugen sie zwei Strahlbüschel erster Ordnung. Da von jedem derselben zwei Strahlen die homologen des in Σ_i entsprechenden Büschels schneiden, so erhält man auch in diesem Falle vier Strahlen p_i .

Die Annahme, m_k sei Tetraederkante des Complexes Γ_{ik} führt zu den Doppelebenen des Bündels Φ_{ik}^4 . Die Büschel m_i und m_k liegen ineinander und haben zwei Ebenen α_{ik}^x entsprechend gemein. Dem ebenen System α_{ik}^x des Raumes Σ_i entspricht ein collineares System auf α_{ik}^x und so oft zwei entsprechende Strahlen dieser Systeme sich schneiden, ebenso

oft wird α_{ik}^x als Ebene des Bündels Φ_{ik}^4 erhalten. Die beiden Systeme erzeugen durch die Verbindungsebenen entsprechender Geraden einen Ebenenbüschel E_{ik}^3 dritter Ordnung und durch jeden Punkt auf α_{ik}^x gehen zwei auf α_{ik}^x liegenden Axen dieses Büschels. Durch jeden Punkt von α_{ik}^x geht deshalb ein centraler Ebenenbüschel vierter Ordnung, welcher zum Bündel Φ_{ik}^4 gehört und für welchen α_{ik}^x Doppelebene ist. α_{ik}^x ist demnach Doppelebene des Bündels Φ_{ik}^4 .

Es gibt sechs Ebenenbündel Φ^4 , welche durch Namen und Stellung der Indices unterschieden werden. Die Fundamentalebene eines jeden Complexes sind Doppelebenen der beiden Bündel, welche dieselben Indices besitzen wieder Complex.

Gemeinsame Büschel zweier Bündel.

Zwei der sechs Ebenenbündel vierter Ordnung haben einen Ebenenbüschel sechzehnter Ordnung gemein. Die Bündel können auf vier verschiedene Arten zu zweien zusammengestellt werden, nämlich

I. Zwei Bündel mit gleichem Index an erster Stelle wie Φ_{ik}^4 und Φ_{il}^4 .

II. Zwei Bündel mit gleichem Index an zweiter Stelle Φ_{ki}^4 und Φ_{li}^4 .

III. Zwei Bündel, welche die drei Indices besitzen, aber an keiner Stelle den gleichen; Φ_{ik}^4 und Φ_{kl}^4 .

IV. Zwei Bündel, welche die gleichen Indices an verschiedener Stelle besitzen wie Φ_{ik}^4 und Φ_{ki}^4 .

Ist φ eine Ebene, auf welcher drei homologe Strahlen

der collinearen Räume liegen, so gehört sie zu jedem Büschel sechzehnter Ordnung, der irgend zwei Bündeln gemeinsam ist. Diese Ebenen — die «Hauptebenen der collinearen Räume» — bilden bekanntlich einen Ebenenbüschel sechster Ordnung; also:

Jeder zwei Ebenenbündeln Φ^4 gemeinsame Ebenenbüschel degeneriert in einen Ebenenbüschel zehnter Ordnung und in den Ebenenbüschel sechster Ordnung, welcher von den Hauptebenen der collinearen Räume gebildet wird.

Gehört eine Ebene π zu den Bündeln Φ_{ki}^4 und Φ_{il}^4 , so liegt in derselben ein Strahl des Systemes X_k und der in Σ_i homologe p_i , sowie ein Strahl p'_i des Systems X_l und der in Σ_i homologe p'_i . Fallen p_i und p'_i zusammen, so decken sich p_k und p'_k , p_l und p'_l . p_i p_k p_l bilden ein Dreieck und π ist Hauptebene der collinearen Räume. Sind p_i und p'_i verschieden, so wird p_k als Systemstrahl von X_k von p_l geschnitten, p'_i als Systemstrahl von X_l von p'_k . Weil aber p_i und p'_i sich schneiden, so schneiden sich p_k und p'_k , p_l und p'_l ; demnach gehen die drei Strahlen p_k p'_k p_l durch einen Punkt, ebenso p_l p'_l p'_k . Durch die beiden Punkte gehen die Strahlen p_l p'_k ; es schneiden sich also die homologen Strahlenpaare p_k , p'_k und p_l , p'_l in einem Punkte. Er ist ein Punkt A_{kl}^x ; p_i und p'_i schneiden sich demnach im homologen Punkte A'^x_{kl} . Nur solche Ebenen π werden bei verschiedenen p_i und p'_i erhalten, welche zu einem der Ebenenbüschel erster Ordnung gehören, deren Axe eine der Geraden $[A^x_{lk} A'^x_{lk}]$ ist. Der Ebenenbüschel sechzehnter Ordnung de-

generiert deshalb in die vier Ebenenbüschel erster Ordnung und den doppelt zu zählenden Ebenenbüschel sechster Ordnung, welcher von den Hauptebenen gebildet wird. Zwei Ebenenbüschel vierter Ordnung mit beliebigem gemeinsamen Centrum, von welchem der eine zum Bündel Φ_{ki}^4 , der andere zum Bündel Φ_{ii}^4 gehört, haben also vier Ebenen, von welchen jede zu einem der Büschel erster Ordnung gehört und sechs doppelt zu zählende Ebenen des Hauptebenenbüschels gemein, haben folglich in diesen sechs Ebenen gemeinsame Berührungsstrahlen. Daraus folgt unmittelbar:

Zwei Bündel vierter Ordnung mit gleichem Index an zweiter Stelle haben in den Hauptebenen gemeinsame Berührungspunkte.

Ist π eine gemeinsame Ebene des Bündel Φ_{ki}^4 und Φ_{ik}^4 so liegt in π ein Strahl p_k des Systems X_k und der homologe Strahl p_i , sowie ein Strahl p'_i des Systems X_i und der homologe p'_k . Sind p_i und p'_i verschieden, so ist π eine Ebene α_{ik} ; durch diese Annahme werden nur spezielle Ebenen erhalten. Sind p_i und p'_i identisch, so sind p_i und p_k Strahlen der Systeme X_i resp. X_k , welche in den Räumen Σ_i und Σ_k homologe Gerade sind. Es werden dann p_i und p_k von dem homologen Strahle p_i geschnitten. Dies kann auf zwei wesentlich verschiedene Arten geschehen: entweder liegen p_i , p_k , p_i in einer Ebene, dann ist π Hauptebene, oder p_i p_k p_i schneiden sich in einem Punkt. Man hat den Satz:

Schneiden sich die homologen Strahlen p_i p_k p_i in einem Punkt, so gehört die Ebene $(p_i$ $p_k)$ zu dem Ebenbüscheln

zehnter Ordnung, der zu den Bündeln Φ_{ki}^4 und Φ_{ik}^4 gehört und alle solche Ebenen $(p_i p_k)$ erfüllen den Büschel.

Dieses und frühere Resultate gestatten, folgende sich dual gegenüber stehende Sätze aufzustellen:

Die Eckpunkte der Trieder, deren Kanten homologe Strahlen dreier collinearen Räume sind, bilden eine Raumcurve sechster Ordnung, indess die Seitenflächen drei Ebenenbüschel zehnter Ordnung erfüllen.

Die Ebenen der Dreiecke, deren Seiten homologe Strahlen dreier collinearen Räume sind, erfüllen einen Ebenenbüschel sechster Ordnung, indess die Ecken drei Raumcurven zehnter Ordnung beschreiben.

